

INTENTO DE SUICIDIO EN LA POBLACIÓN JUVENIL

Alonso López L, Barrera Alarcón N, Lao Gimenez MN
AGSNA , Hospital Torrecárdenas, Residencia Ancianos

alonsolopez.laura@gmail.com

INTRODUCCION

Según la OMS uno de los datos más llamativos a nivel internacional es el aumento de las tasas de suicidio en la población de jóvenes de 15 a 24 años, convirtiéndose en una de las 3 causas más frecuentes en ese rango de edad. Por esta cifra alarmante se intentan poner medidas a través del estudio de las causas.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una búsqueda sistemática en numerosas bases de datos de revisiones sistemáticas y GPs (Cochrane Library Plus, HTA, DARE Y Guíasalud) y generales (EMBASES y Medline



RESULTADOS

Mediante las recomendaciones del proceso enfermero que a continuación se formulan se valoran los factores de riesgo con lo cual la presencia de estas conductas disminuye, siendo la prevención selectiva y la continuación evaluación de los niños y adolescentes como de las personas cercanas (padres, profesores, amigos)

OBJETIVOS:

Valorar los factores de riesgo asociados a la conducta suicida.

Valorar las intervenciones para reducir el riesgo de estas conductas que pueden ser llevadas a cabo por el entorno cercano o por equipos multidisciplinares.



CONCLUSIONES

el sexo masculino y adolescencia en mayor incidencia que el sexo femenino, depresión, inhibiciones emocionales, déficit de solución de problemas y patrón de apego inseguro a la infancia, abuso de sustancias, antecedentes familiares de suicidio, intentos previos, psicopatología de los padres, conflictos familiares o violencia doméstica, acontecimientos estresantes, homosexualidad y maltrato físico o abuso sexual son factores de riesgo que siempre hay que prevenir. Como recomendación internacional, restringir el acceso a medios potencialmente letales.