

Casuística de la neoplasia maligna de colon

FUNDAMENTO Y OBJETIVO:

El cáncer de colon es la neoplasia más frecuente del tubo digestivo, siendo en España la segunda causa de mortalidad por cáncer.

RESULTADOS: Tras analizar los datos por edad y sexo, se ha obtenido que la prevalencia del cáncer de colon es de un 40% en mujeres frente al 60% en hombres.

Respecto a las diferentes localizaciones, el lugar más habitual de aparición es en colon sigmoideo con un 40% del total, seguido del colon ascendente o derecho con un 16.7%.

Siendo la edad de aparición más frecuente de más de 75 años en mujeres mientras que en varones, la edad desciende al rango de 65 a 74 años.

Desde el punto de vista de los GRD (Grupos Relacionados de Diagnóstico), los datos indican que los más frecuentes son:

GRD 585 Procedimiento mayor estómago, esófago, duodeno, intestino delgado y grueso con CC Mayor con aproximadamente un 25% de los casos en la mayoría de los estudios realizados.

GRD 148 Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso con CC con otro 25%.

GRD 149 Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso sin CC con el mismo porcentaje que los anteriores.

MATERIAL Y METODO: Se han revisado los diversos estudios sobre el tema incluidos en Medline, Cuiden y Google, en los que se analizan distintas poblaciones hospitalarias.

CONCLUSIONES:

Los resultados nos indican que:

La mayoría de casos ocurren entre los 60 y los 70 años.

La presencia de pólipos de colon aumenta su aparición

La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o la poliposis adenomatosa familiar son enfermedades precursoras.